

CASO CLÍNICO WEB

TITULO: Coxalgia bilateral en paciente gestante.

AUTORA: Marta García Mifsud.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Mujer de 38 años sin antecedentes de interés salvo gestante de 36 semanas, remitida a Urgencias por dolor en el tobillo derecho y ambas caderas de un mes de evolución sin antecedente traumático. Refirió empezó con dolor e hinchazón de tobillo derecho y posteriormente dolor de ambas caderas que le dificultaba la marcha, de manera que había tenido que coger muletas y posteriormente silla de ruedas, con la que acudía. No se realizaron pruebas complementarias, se diagnosticó de “Esguince de tobillo”. Se pautó vendaje mediante Tensoplast y Paracetamol; y se remitió a su domicilio.

Al mes, 40 semana de gestación, ingresó en el Hospital por contracciones, que desembocaron en un parto vaginal sin complicaciones. Durante el ingreso, persistió la sintomatología de dolor de tobillo derecho, caderas e ingles durante la deambulación que cedía con el reposo, con agudizaciones que incluso dificultaban el sueño nocturno.

A la exploración:

- Caderas: Movilidad completa e indolora de ambas articulaciones coxofemorales. Dolor a la palpación de trocánter mayor bilateral. Sin signos inflamatorios.
- Raquis lumbar: no dolor espinosas lumbares, no contracturas musculares lumbares, movilidad lumbar completa e indolora. ROTS patelares y aquíleos presentes y simétricos. Lassègue y Bragard negativos. Balance muscular: MMII 3/5 bilateral. Sensibilidad superficial MMII al pinchazo sin alteraciones. Caminaba con claudicación de ambos miembros inferiores y flexión de ambas caderas y necesitaba muletas o silla de ruedas para sus desplazamientos.

¿Qué patología presentó nuestra paciente?

¿Qué pruebas diagnósticas hubieras solicitado?